

অবমুক্তির সন : ১৯৬৭
 প্যারেন্টেজ : Co535 × Co 381
 সর্বোচ্চ ফলন : ৮৩ টন/হেক্টর
 গড় ফলন : ৭৯ টন/হেক্টর
 চিনি ধারণ ক্ষমতা : ১২.৯৭% ।
 চাষযোগ্য অঞ্চল : বৃহত্তর পাবনা, বগুড়া,
 কুষ্টিয়া, জামালপুর ও
 রাজশাহী

- লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- লবণাক্ততাসহ ব্যাপক এলাকায় আবাদযোগ্য
- বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু
- মধ্যম ফলনশীল



- বয়স্ক আখের পর্বমধ্য সিলিন্ডার (Cylindrical) আকৃতির এবং পুরাতন পাতাগুলি হেলে থাকে।
- পাতার খোল বেগুনি রঙের এবং অল্প বয়স্ক চারার পাতার আগাতেও সামান্য বেগুনি আভা দেখা যায়।

পূর্ণ বয়স্ক ইক্ষু গাছ

কাণ্ড ও পর্বমধ্য

- আখের চোখ ওভেট (Ovate) আকৃতির এবং চোখের উপরিভাগ প্রোথরিং ট্রাস করে।
- বাহিরের অরিকল (Auricle) ট্রানজিশনাল-২ (Transitional-2) এবং ভিতরের অরিকল ট্রানজিশনাল-১ (Transitional-1) ধরনের
- অপুষ্পক (Non-flowering) এবং মধ্যম পরিপক্ক (Mid-maturing) জাত



চোখ

বাহির ও ভিতরের অরিকল

লবণাক্ত এলাকাসহ দেশের ব্যাপক অঞ্চলে এ জাত চাষ করা যায়। তাই, এ জাতের চাষ বৃদ্ধি করা হলে কৃষক তথা দেশ আর্থ, চিনি ও গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।