

|                  |   |
|------------------|---|
| অবমুক্তির সন     | : ২০০৯  |
| প্যারেন্টেজ      | : BC <sub>5</sub> × Isd 25  |
| সর্বোচ্চ ফলন     | : ১৪১ টন/হেক্টর   |
| গড় ফলন          | : ১০১ টন/হেক্টর   |
| চিনি ধারণ ক্ষমতা | : ১৪.২৩%  |
| চাষযোগ্য অঞ্চল   | : বৃহত্তর জামালপুর, গাজীপুর<br>কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী,<br>ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট |

- লাল পচা রোগ প্রতিরোধী
- উন্নত মানের গুড় তৈরী হয়
- উচ্চ ফলনশীল
- বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু
- চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত
- অপুষ্পক, আগাম পরিপক্ক



- পর্বমধ্য ববিন (bobbin) আকৃতির
- পুষ্পক এবং আগাম পরিপক্ক জাত

পূর্ণ বয়স্ক ইক্ষু গাছ

কাভ ও পর্বমধ্য

- আখের চোখ মধ্যম ও ডিম্বাকৃতির এবং উপরিভাগ গ্রোথরিং স্পর্শ করে
- বাহিরের অরিকল ছোট বর্শা (short lanceolate) আকৃতির এবং ভিতরের অরিকল ডেলটয়েড (deltoid) ধরনের
- পাতার খোলে তুল (Spine) দেখা যায় না



চোখ

বাহির ও ভিতরের অরিকল

উচ্চ ফলনশীল, বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা এবং বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত অঞ্চলসহ দেশের ব্যাপক অঞ্চলে চাষ করা যায়। তাই, কৃষক তথা দেশ এ জাতের আখ চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে।