

অবমুক্তির সন	: ২০০৯
প্যারেন্টেজ	: Isd 27 × Isd 24
সর্বোচ্চ ফলন	: ১৫০ টন/হেক্টর
গড় ফলন	: ১০৩ টন/হেক্টর
চিনি ধারণ ক্ষমতা	: ১৪.৮৬%
চাষযোগ্য অঞ্চল	: বৃহত্তর জামালপুর, গাজীপুর কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাট

- উচ্চ ফলনশীল, আগাম পরিপক্ব
- উন্নত মানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত
- লালপাচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত
- খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ক্ষমতা খুব বেশী



- কাণ্ড (stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং পাটল বর্ণের
- গিরা (node) ফোলা (swollen) এবং পাতা বারার দাগ স্পষ্ট।
- পর্বমধ্য ববিন (bobbin) আকৃতির
- এ জাতের ইক্ষুতে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়

পূর্ণ বয়স্ক ইক্ষু গাছ

কাণ্ড ও পর্বমধ্য

- আখের চোখ মধ্যম ডিম্বাকৃতির (oval) এবং উপরিভাগ গ্রোথরিং স্পর্শ করে
- ভিতরের অরিকল ডেলটয়েড (Deltoid) বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-ও আকৃতির
- পাতার খোলে হুল (Spine) দেখা যায় না



চোখ

বাহির ও ভিতরের অরিকল

উচ্চ ফলনশীল, বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত অঞ্চলের উপযোগী এবং গুড়ের গুণগতমান ভাল হওয়ায় কৃষক তথা দেশ আর্থ, চিনি ও গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।