

অবযুক্তির সন	ঃ ১৯৮২
প্যারেন্টেজ	ঃ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত
সর্বোচ্চ ফলন	ঃ ৯৯ টন/হেক্টর
গড় ফলন	ঃ ৭৯ টন/হেক্টর
চিনি ধারণ ক্ষমতা	ঃ ১৩.১৯%
চাষযোগ্য অঞ্চল	ঃ বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া

- লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- ব্যাপক এলাকায় আবাদযোগ্য
- বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু
- মধ্যম ফলনশীল



পূর্ণ বয়স্ক ইক্ষু গাছ



কান্ড ও পর্বমধ্য

- আখের পর্বমধ্য সিলিন্ড্রিক (Cylindrical) আকৃতির
- আখের ভিতর একটু ফাঁপা আছে
- অপুষ্পক (Non-flowering) এবং  
মধ্যম পরিপক্ষ (Mid-maturing)  
জাত

- বাহিরের অরিকল (Auricle)  
ট্রানজিশনাল-২ (Transitional-2)  
এবং ভিতরের অরিকল ল্যানসিওলেট  
(Lanceolate) ধরনের
- পাতার খোলে বেগুনি রং এবং অন্ন  
বয়স্ক চারার পাতার আগাতেও সামান্য  
বেগুনি আভা দেখা যায়।



চোখ



বাহির ও ভিতরের অরিকল

এ জাতটি দেশের ব্যাপক অঞ্চলে চাষ করা যায়। এ জাতটি চাষ করা হলে কৃষক তথা দেশ আখ, চিনি ও গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।